

Jaargang 1, nr. 1  
eind 2012

**In dit nummer:**

Aandachtspunten  
afwijkend monddrag  
Wat zeggen de cijfers?




@LogoBuitenhove  
Volg ons ook via  
social media!

# Nieuwsbrief

J.H. Knoopstraat 6d | 8933 GS | Leeuwarden  
info@logopediepraktijkbuitenhove.nl | (058) 30 30 133  
Gevestigd in Medisch Centrum Buitenhove  
www.logopediepraktijkbuitenhove.nl



Logopediepraktijk  
Buitenhove



## Belangrijke informatie:

Ook in 2013 zit logopedie in het **basispakket**: alle kosten worden rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Houdt wel rekening met het **eigen risico** (vanaf 18 jaar).

Logopediepraktijk Buitenhove is nog **niet direct toegankelijk**, omdat de grootste zorgverzekeraar De Friesland dit nog niet heeft opgenomen in haar vergoedingspakket.



**Riemke Plantenga**

Friezin, ruim 5 jaar ervaring. Innovatief, nieuwsgierig, vooruitstrevend, doorzetter, vriendelijk, doener, multidisciplinair.

**Ineke de Vries**



Moeder, 30 jaar (preverbaal) logopedist, praktijkhouder, mediërend leren, gedreven, aanpakker, kwalitatief.

## Aandachtspunten afwijkend monddrag

Logopediepraktijk Buitenhove vindt samenwerking met haar verwijzers erg belangrijk en informeert u graag per kwartaal met een nieuwsbrief over logopedie en afwijkende mondgewoonten. De tandarts(ass.)/mondhygiënist/orthodontist spelen een grote rol in het onderkennen hiervan. De zorg van de cliënt staat centraal. Door een goede samenwerking met verwijzers kan de zorg voor de cliënt zo efficiënt en effectief mogelijk verlopen.

Conform de richtlijnen van de Werkgroep Kindertandheelkunde NMT 2011

### CONTROLE OP VORM VERSUS FUNCTIE:

#### Constateren van een afwijkende vorm zoals:

VOB (niet gerelateerd aan wisselfase of een skelettaal open beet)

Uni- of bilaterale open beet (niet skelettaal gerelateerd)

Uni- of bilaterale kruisbeet

Gotisch gehemelte

Niet skelettaal gerelateerde SOB (pseudo klasse II)

Niet skelettaal gerelateerde omgekeerde beet (pseudo klasse III)

Ankylotisch frenulum linguale

Rugae palatinae sterk vergroot (t.g.v. mondademen)

#### Constateren afwijkend monddrag zoals:

Persisterend duimzuigen, vingerzuigen of speenzuigen

Afwijkende slik (protraal, lateraal, interdentaal)

Mondademen (vaak i.c.m. hypotone lichaamshouding)

Faciale grimas (tijdens slik wijst op interdentaliteit)

Recidiverende Otitis Media t.g.v. afwijkende slik

#### Constateren afwijkende (logopedische) articulatie zoals:

Lispelen en slissen

## Wat zeggen de cijfers?

Bij een verticale open beet ten gevolge van afwijkend monddrag, is er wanneer alleen orthodontie wordt toegepast, **39%** kans op relaps. Door samen te werken met de logopedist wordt deze kans op een relaps verkleind.

Tussen 6 en 8 jaar is de beste leeftijd om te starten met OMFT.

Tussen 3 en 6 jaar kan op een speelse wijze begeleiding plaatsvinden op het gebied van afwijkend monddrag door aandacht voor lipsluiting, stimuleren van neusademing om zo ernstige afwijkingen later te voorkomen.

M.A. Altink, W.J.J. Tieben, E.E. Witteveen, G.I. van Woerden; P. Helderop, T. Muns-Wilminck, Drs. B.P.M. Verlinden

